

Folytonnövő paradicsom tápanyagutánpótlása

IDŐZÍTÉS HATÁS	KIÜLTETÉS	KIÜLTETÉS UTÁN	VIRÁGZÁS KEZDETÉN	ELSŐ TERMÉS KÖTÉSEKOR	TERMÉS NÖVEKEDÉS ÉS KÖTÉS FÁZISÁBAN	FOLYAMATOS TERMÉS KÖTÉS FÁZISÁBAN	TERMÉS ÉRÉS FÁZISÁBAN
KIÜLTETÉSKORI KRÍZIS KIVÉDÉSE	RADIFARM 0,5-0,6 liter/1000m ²	RADIFARM 0,3-0,4 liter/1000m ²					
ELLENÁLLÓKÉ- PESSÉG FOKO- ZÁSA, JÓ EGÉSZ- SÉGI ÁLLAPOT FENNTARTÁSA	KENDAL 1-1,5 liter/1000m ²	KENDAL 1-1,5 liter/1000m ²	KENDAL		1-1,5 liter/1000m ² Lombtrágyaként: 0,15-0,2 liter/1000m ²		
OPTIMÁLIS GYÖKERESÉDÉS, VIRÁGZÁS ÉS TERMÉS KÖTÉS	MASTER 13-40-13 2-3 kg/1000m ²	MASTER 13-40-13 3 kg/1000m ²	VIVA 2 liter/1000m ² MASTER 13-40-13 3 kg/1000m ²				
OPTIMÁLIS VEGETATÍV NÖVEKEDÉS ÉS EGYENLETES TERMÉSKÖTÉS				MASTER 20-20-20 3-5 kg/1000m ²	VIVA 2 liter/1000m ² +MASTER 17-6-18 3-5 kg/1000m ² FERRILENE 6 0,5 kg/1000m ²		VIVA 3 liter/1000m ² 15-25 naponta
CSÚCSROTHADÁS KIVÉDÉSE				Lombtrágyaként: CALBIT C 0,2-0,3 liter/100 liter		BREXIL Mg 0,5-1 kg/1000m ² +Lombtrágyaként: CALBIT C 0,2-0,3 liter/100 liter	
JÓ TERMÉS- MINŐSÉG						MASTER 15-5-30+2 3 kg/1000m ² FERRILENE 6 0,5 kg/1000m ²	