

Krizantém tápanyagutánpótlási technológia

Tápoldatozás:

ID ZÍTÉS HATÁS	Ültetéskor és 1 héttel kés bb	2 héttel az ültetés után	3 héttel az ültetés után a bimbók megjelenéséig	Bimbók megjelené- sét 1 a ciklus végéig (7-8 naponta)
Ültetéskori stressz elkerülése, mielőbbi legyökerezés, intenzív tápanyagfelvétel	RADIFARM 2,5L/m ³ MASTER 13-40-13 0,8-1 kg/m ³			
Ellenállóság és a jó kondíció fejlesztése	KENDAL 1-2,5 L/m ³	KENDAL 1-2,5 L/m ³	KENDAL 1-2,5 L/m ³	KENDAL 1-2,5 L/m ³
A gyökérzet további fejlesztése		VIVA 1,5-3 L/m ³ MASTER 13-40-13 0,8-1 kg/m ³		
Optimális fejl dés, a min ség megalapozása			VIVA 1,5-3 L/m ³ MASTER 20-20-20 és/vagy MASTER 15-5-30+2 fajtaigény szerint 0,8-1,2 kg/m ³	
Jó min ség, b hozam				VIVA 1,5-3 L/m ³ MASTER 10-18-32 0,8-1,2 kg/m ³
Mikroelem- hiány megel zése	BREXIL Combi 900 g/m ³ (10-15 naponta)			
Megfelel min ség elérése	CALBIT C 3-5 Liter/1000m ² (10-15 naponta)			

A vashiány megel zésére és a megfelelő bimbóképz déshez a **FERRILENE 6** 0,1-1 gramm/t **VIVA**-val együtt **tápoldatban** kijuttatva.

Lombtrágyázás:

Ültetés után, az els hónapban két alkalommal **KENDAL** 150-200 ml/hl. A kezelések ismételhet k a ciklus egész hosszában, 250 ml/hl **CALBIT C**-vel kiegészítve, 7-10 naponta, a stresszt rés növelésére célszer **MEGAFOL**-t használni 200-250 ml/hl töménységben 10-15 naponként.

A virágszín fokozására a **SWEET** használható 200-250ml/hl töménységben bimbós állapotban és egy hét múlva ismételve.

