


Tojásgyümölcs tápanyagutánpótlása:

IDŐZÍTÉS HATÁS	Ültetéskor és 1 hét múlva	Virágzásig	Virágzástól
Gyors gyökeresedés	MASTER 13-40-13 0,15 kg/100 liter +RADIFARM 0,2-0,25 liter/100 liter		
Gyors fejlődés		MASTER 17-6-18 1-1,2 kg/1000 liter	
Megfelelő termésminőség			MASTER 15-5-30+2 1-1,2 kg/1000 liter Erős terheltség esetén: MASTER 17-6-18 1-1,2 kg/1000 liter
Intenzív Tápanyagfelvétel		VIVA 2-4 liter/1000 m ²	
Kalciumhiány megelőzése		CALBIT C lombtrágyaként hetente: 0,2-0,25 liter/100 liter	
Egészséges növények	KENDAL lombtrágyaként: 10-14 naponta 0,2-0,25 liter/100 liter, belocsolással: 1-1,5 liter/1000 m ²		
Virágzás, terméskötés segítése			BOROPLUS Lombtrágyaként 0,1liter/100 liter
Nagyobb méretű termések			BENEFIT PZ Mogyoró mérettől lombtrágyaként 0,15-0,2liter/100 liter
Mikroelemhiány megelőzése	BREXIL Combi lombtrágyaként: 0,15 kg/100 liter		

A **KENDAL**, **BENEFIT PZ**, **BREXIL Combi**, **BOROPLUS** és a **CALBIT C** egymással és különböző növényvédőszerrel jól kombinálható. Réz tartalmú szerekkel kombinálva kijuttatási próbát javasolunk.